

Fachinformation: Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung. Stand: **November 2020**.

Fachinformation: **Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack** 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung. Stand: **Oktober 2022**.

Fachinformation: **Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**. Stand: **September 2020**.

Fachinformation: **Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**. Stand: **März 2022**

Basistext für Anzeigen in Fachkreisen

**Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung**

**Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung**

**Dobendan® Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**

**Dobendan ® Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**

Wirkstoff: Flurbiprofen

**Zusammensetzung:** *Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung / 1 Lutschtablette*

*(Ltb) enth.:* 8,75 mg Flurbiprofen. *Sonst. Best. Spray:* Betadex,

Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph.Eur.), Citronensäure-Monohydrat,

Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218), Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216),

Natriumhydroxid, N,2,3-Trimethyl-2-(propan-2-yl)butanamid, Saccharin-Natrium (E954),

Hydroxypropylbetadex 0,62, gereinigtes Wasser. *Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75*

*mg zusätzlich:* Minze-Aroma, Kirsch-Aroma; *Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig &*

*Zitrone zusätzlich:* Honig-Aroma, Zitronen-Aroma; *Sonst. Best. 1 Lutschtablette Dobendan*

*Direkt:* Macrogol 300, Kaliumhydroxid (E525), Zitronenaroma, Levomenthol, Honig, Sucrose,

Glucose. *Sonst. Best. 1 Lutschtablette Dobendan Direkt Zuckerfrei:* Macrogol 300,

Kaliumhydroxid (E525), Levomenthol, Orangenaroma, Acesulfam-Kalium (E950), Maltitol-

Lösung (E965), Isomaltitol (E953). **Anwendungsgebiete:** *Spray:* zur kurzzeitigen

symptomatischen Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Erwachsenen.

*Lutschtabletten:* zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften

Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Flurbiprofen, oder einen der sonst. Best. des

Arzneimittels; Asthma, Bronchospasmus, Rhinitis, Angioödem oder Urtikaria nach ASS oder

NSAR Einnahme in der Anamnese; bestehende oder in der Vergangenheit aufgetretene

rezidiv. Magen- oder Darmgeschwüre, Magen-Darm-Blutungen oder -Perforation, schwere

Kolitis, Blutungs- oder Blutbildungsstörungen, die mit einer früheren NSAR Therapie

zusammenhängen; letztes Trimester der Schwangerschaft; schwere Herz-, Nieren- oder

Leberinsuffizienz. *Beim Spray zusätzlich:* Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218), Propyl-

4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216); Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. *Bei den*

*Lutschtabletten zusätzlich:* Levomenthol. **Nebenwirkungen: Häufig:** Schwindel,

Kopfschmerzen, Parästhesie, Rachenreizung, Diarrhö, Ulzerationen der Mundschleimhaut,

Übelkeit, Schmerzen im Mund, orale Parästhesie, oropharyngeale Schmerzen, warmes,

brennendes od. kribbelndes Gefühl im Mund. **Gelegentlich:** Insomnia, Somnolenz,

Verschlimmerung von Asthma und Bronchospasmen, Dyspnoe, Pfeifatmung,

oropharyngeale Blasenbildung, pharyngeale Hypoästhesie, abdominale Distension,

Abdominalschmerzen, Verstopfung, Mundtrockenheit, Dyspepsie, Flatulenz, Glossodynie,

Dysgeusie, orale Dysästhesie, Erbrechen, diverse Hautausschläge, Pruritus, Fieber,

Schmerzen. **Selten:** anaphylaktische Reaktionen. **Nicht bekannt:** Anämie,

Thrombozytopenie, Ödeme, Hypertonie, Herzinsuffizienz, Hepatitis, schwere Hautreaktionen

wie bullöse Reaktionen, einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom und toxischer epidermaler

Nekrolyse. **Warnhinweise:** *Spray* enthält: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218) und

Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216). *Dobendan Direkt:* enthält: Levomenthol, Sucrose,

Glucose (enthält Weizenstärke und Schwefeldioxid (E220)), Honig, Zitronenaroma (enthält

Butylhydroxyanisol (E320), Citral, Citronellol, d-Limonene, Farnesol, Geraniol und Linalool).

*Dobendan Direkt Zuckerfrei:* Levomenthol, Maltitol-Lösung (E965), Isomaltitol (953).

**Fachinformation beachten.**

Fachinformation: Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung. Stand: **November 2020**.

Fachinformation: **Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig- und Zitronengeschmack** 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung. Stand: **Oktober 2022**.

Fachinformation: **Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**. Stand: **September 2020**.

Fachinformation: **Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**. Stand: **März 2022**

**DOBD0170**

**Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – 69067 Heidelberg**