

Vergleich der Blistersysteme

Blistersysteme, Einnahmehilfen		Einnehme-Becher	Dosett, Medi7, Anabox	Blister-Karte	Schlauch-Blister	Becher-Blister
Verwendung Zeitspanne	eine Woche	ja	ja	ja	ja	ja
	ein Monat	nein	nein (1)	ja	ja	ja
System-Eigenschaft		offenes System	offenes System	geschlossenes System	geschlossenes System	geschlossenes System
Herstellung	manuell	✓	✓	✓	⊘	✓
	mit Maschine	⊘	⊘	⊘	✓	✓ ⁽²⁾
geeignet für	feste Formen	✓	✓	✓	✓	✓
	Flüssigkeit	✓	⊘	⊘	⊘	✓ ⁽³⁾
Identifizierung des Inhalts		i.d.R. nicht möglich	evtl. aus Beiblatt	aus Blister-Etikett	Beschriftung auf Blister	Beschriftung auf Blister
ohne Systembruch (Herstellen/Abgabe im gleichen System)		✓	⊘	⊘	⊘	✓
Hygiene der Abgabe an Bewohner/ Patient		im Original-Becher	Umfüllen in Becher	Umfüllen in Becher	Umfüllen in Becher	im Original-Becher
Schutz der Medikation	z. B. Umfallen des Vergabe-bechers	⊘	⊘	⊘	⊘	✓
Verteilen	vom Medi-Tablett	✓	✓	⊘	✓	✓
	aus Medi-Wagen	-	teilweise	✓	✓	✓
Schnelle Änderungen durch		Änderung im Becher selbst	Änderung im Dosett etc.	Zusatzblister, Kompl. Ersatz	Einzeltüten, Ersatzstreifen	einzelner Ersatzbecher

⁽¹⁾ Anabox für 1 Monat trotz Empfehlung, Medikamente in offenen Systemen nicht länger als 7 Tage zu lagern.

⁽²⁾ in Entwicklung.

⁽³⁾ sofern heiß-verschweißt.